

# BURROW OAT BAIT<sup>®</sup>

COMMERCIAL

## GARANTIE:

Phosphure de zinc .....2%

N° D'HOMOLOGATION 24795  
LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

EPA Est. No. 61282-WI-1

## LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

## TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS



## AVERTISSEMENT

## POISON


AVERTISSEMENT : contient l'allergène soya.

### MODE D'EMPLOI

**GÉOMYS À POCHES DU NORD** (*Thomomys talpoides*) et **SPERMOPHILES** (de Richardson, colombien, a treize lignes, de Franklin, etc.) (*Spermophilus* spp.). **BURROW OAT BAIT** peut être utilisé dans le cadre d'un programme de lutte et peut être distribué avec un creuse-terrier. Sa distribution peut se faire au printemps, en été et en automne. Pour de meilleurs résultats, le distribuer avant ou après la croissance de la végétation. Pour connaître les meilleurs moyens de lutte dans la région, consulter le spécialiste provincial de la lutte contre les ravageurs vertébrés. **BURROW OAT BAIT** peut être utilisé pour la protection des champs de luzerne, des pâturages, des parcours, des terrains de golf et des parcs ainsi que des endroits non cultivés comme les rangs d'arbres nouvellement plantés, les bords de routes et les lignes enfouies.

**GÉOMYS À POCHES – APPÂTAGE AVEC UN CREUSE-TERRIER**: Employer un creuse-terrier tel que le **WESTERN ALFALFA** ou le **GOFER**. Creuser un terrier d'une profondeur de 20 à 40 cm. Le creuse-terrier distribué l'appât dans les galeries des géomys. Utiliser **BURROW OAT BAIT** à la dose de 3,3 kg/ha. Le distribuer en damier, à tous les 7,5 m. partout dans la zone infestée. Après sa distribution, niveler les buttes, avec une herse ou un outil similaire, pour un faciliter la vérification. Vérifier l'efficacité du traitement 10 jours après la distribution en comptant les buttes en activité. S'il en reste, les retraiter, avec une sonde manuelle ou un creuse-terrier, pour maximiser l'efficacité du traitement. Répéter le traitement au besoin. Un traitement au pourtour du champ peut empêcher une réinfestation.

### DISTRIBUTION EN DAMIER AVEC UN CREUSE-TERRIER



**GÉOMYS À POCHES – APPÂTAGE MANUEL**: Ouvrir le terrier, mettre une cuillerée à thé rase dans chaque butte en activité et fermer le terrier. Après 10 jours, vérifier s'il y a des buttes en activité. S'il en reste, les retraiter.

**SPERMOPHILES – APPÂTAGE MANUEL**: Pré-appâtage : Pour de meilleurs résultats, mettre 15 g de préappât non traité (de l'avoine entière ou un préappât commercial non traité), à une distance de 15 à 20 cm du trou, 7 jours avant de distribuer **BURROW OAT BAIT**. Appâtage : Mettre de **BURROW OAT BAIT** à une distance de

15 à 20 cm du trou. En utiliser 15 g par trou sur le sommet de la butte. N'en distribuer qu'en l'absence de pluie ou de neige 48 heures avant ou après. En distribuer au printemps, avant la croissance de la végétation verte. On peut aussi en distribuer au début de juillet, les spermophiles commençant alors à se nourrir de graines plutôt que de végétation, ou en automne, après la disparition de la végétation verte.

### PRÉCAUTIONS

**GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS**. Peut être mortel en cas d'ingestion. Éviter tout contact avec la peau. Porter des gants en caoutchouc lors de la manipulation de l'appât, et ne pas inhaler les poussières ni les vapeurs. Ne pas contaminer les aliments. Éloigner les enfants et les animaux familiers et domestiques, surtout des endroits appâtés. Ne pas laisser en piles non protégés. **NE PAS APPLIQUER PAR AVION**.

### PREMIERS SOINS

En cas d'ingestion, faire vomir la victime en lui touchant le fond de la gorge du bout du doigt, puis l'emmener à l'hôpital le plus proche en y apportant la présente étiquette ou contacter un centre antipoison. En cas de contact avec la peau, enlever les vêtements contaminés, puis se laver la peau au savon et à l'eau. En cas de contact avec les yeux, rincer avec beaucoup d'eau pendant 15 minutes, puis obtenir des soins médicaux. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

### RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES

Quiconque manipule du phosphure de zinc et présente des signes et des symptômes comme des nausées, un serrement de poitrine ou une faiblesse doit être examiné immédiatement par un médecin. Éviter les huiles. Il n'y a pas d'antidote spécifique. En cas d'ingestion, on lave habituellement l'estomac à fond. Un lavage au bicarbonate de sodium à 3-5 % a été proposé. Éviter la contamination secondaire due au lavage. Un traitement symptomatique et de soutien est indiqué.

### ÉLIMINATION

Vider tout le contenu récipient dans le réservoir de pulvérisateur. Vérifier si un nettoyage supplémentaire du contenant avant son élimination est exigé en vertu de la réglementation provinciale. Rendre le contenant inutilisable. Éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale. Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de versement ainsi que pour le nettoyage des versements.

**ÉLIMINATION DES RONGEURS**: Jeter les rongeurs morts avec les ordures ou les enterrer.

**AVIS À L'UTILISATEUR**: Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.

Medical 1-800-498-5743

[?] 1-800-621-8829

Manufactured By:

Hacco, Inc.

110 Hopkins Drive • Randolph, WI 53956

Code (NU.NI)